



Več podatkov o ambroziji:
www.uvhvvr.gov.si

**ODSTRANIMO
AMBROZIJO!**

**Preprečimo zaraščenost
zemljišč s škodljivo rastlino!**



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Kaj je ambrozija?

Pelinolistna ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*) je enoletna, grmičasto razrasla rastlina, ki se zelo agresivno razrašča na slabo oskrbovanih kmetijskih površinah, na zemljiščih ob cestah in železnicah, na opuščenih gradbiščih, degradiranih zemljiščih, parkiriščih in na začasnih nasutjih peska. Je zelo nezahtevna rastlina glede rastišča in vlage, se hitro obrašča po košnji in lahko doseže višino tudi do 2 metra. Cvetni prah povzroča seneni nahod.

Izvira iz Severne in Južne Amerike, razširjena je po vsej Evropi in tudi v Sloveniji. Med več kot 20-timi vrstami ambrozij je v Evropi najbolj razširjena pelinolistna ambrozija.



Kako prepoznamo pelinolistno ambrozijo?




LISTI: Ima zelene, dvakrat pernatu deljene liste brez dlačic, ki so po obliki podobni listom pelina.

STEBLO: Okroglasto in poraslo z dlačicami, lahko ima rdečkaste pege.

KORENINA: Dobro razvita srčasta korenina.

CVET: V času cvetenja je rastlina prepoznavna po moških socvetjih, ki izraščajo na koncih poganjkov kot rumene previsne žvrklje. Ženski cvetovi se razvijejo v pazduhah listov ali pri osnovi moškega socvetja, posamično ali po nekaj cvetov združeno.

SEME: Je ovalne oblike, velikosti 2,2 - 3,2 x 1,5 - 2 mm, ki se zlahka primejo na dlake (krzno) ali na oblačila. Povprečno razvite rastline imajo od 2.000 do 3.000 semen.



Rast in cvetenje

Pelinolistna ambrozija lahko začne vznikat v zgodnjih pomladih že konec marca. Cvetenje in sproščanje cvetnega prahu se začne v juliju in traja do konca oktobra. Seme začne dozorevati v avgustu.



RAST

Jan	Febr	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sept	Okt	Nov	Dec

CVET

Zamenjave

Največkrat se pelinolistno ambrozijo zamenja z navadnim pelinom (*Artemisia vulgaris*) (LEVO) in z vrstami zlatih rozg (DESNO).

Do zamenjav lahko prihaja tudi z drugimi vrstami pelina (*Artemisia sp.*), vratičev (*Tanacetum sp.*), rmanov (*Achillea sp.*), mrkačev (*Bidens sp.*) in žametnic (*Tagetes sp.*)



Odstranjevanje

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Uradni list RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast.

Odstranitev ambrozije je potrebno opraviti čimprej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico.

Med glavne načine odstranjevanja ambrozije sodi mehanično odstranjevanje v obliki puljenja oziroma večkratne košnje na način, da rastlina ne razvije cvetov in semen. Rastlina se v primeru, če je ne odstranimo skupaj s koreninami, hitro obraste, zato je treba postopek večkrat ponoviti. Semena v zemlji lahko klijejo postopoma, zato je nahajališče ambrozije treba preverjati do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih, saj je seme v zemlji lahko kalivo tudi do 40 let. Odstranjene rastline, ki še ne cvetijo ali semenijo, lahko odložimo med mešane/biološke odpadke, na kompost ali posušimo in sežgemo na dovoljen in varen način. **Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi semeni ne odlagamo na kompost!**

POZOR! Rastlina je alergena, zato pri odstranjevanju uporabimo rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko!